

bei früheren Besuchen der Fundstelle zum Teil in grösserer Anzahl gesammelt und mir mitgeteilt, von mir indessen noch nicht gefunden worden: ihr Vorkommen scheint sich daher auf vereinzelte locale Ansammlungen zu beschränken.

Von den aufgeführten Arten bezwse. Varietäten sind ausgestorben 2, nämlich: *Zonites verticillus* Fér. var. *praecursor* Weiss und *Limnaea palustris* Müll. var. *diluviana* Andr.,

der mitteldeutschen Fauna nicht mehr angehörig 9, nämlich: *Vitrina kochi* Andr., *Helix solaria* Mke., *Helix vindobonensis* Fér., *Clausilia filograna* Rm., *Clausilia interrupta* G. Pfr., *Clausilia cruciata* Stud. form. *minima* A. S., *Clausilia tumida* K., *Planorbis septemgyratus* Rm. und *Planorbis leucostoma* Müll. form. *perezii* Graëlls,

der mitteldeutschen Fauna angehörig, aber in der Umgegend noch nicht gefunden 2, nämlich: *Pupa edentula* Drap. und *Aeme polita* Hartm.

Die übrigen Arten kommen in der näheren oder weiteren Umgebung des Fundorts auch jetzt noch lebend vor.

Eine neue Pomatia.

Von

Hermann Rolle.

Pomatia pelagonesica n. sp.

Testa omnino exumbilicata globoso-conoidea, solida, ruditer oblique costellato-striata, praesertim in parte supera anfractus ultimi subtilissime spiralter lineata, griseo alba, fasciis duabus latissimis livido-fuscis hic illic albido nebulatis vel interruptis, zonas angustas ad suturam et ad periphe-

riam et latiore ad umbilicum relinquentibus ornata. Spira convexo-conica apice permagno, obtusato, lutescente. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura impressa sulco spirali fortiore marginata discreti, ultimus inflatus, rotundatus, antice valde et profunde convexo-deflexus. Apertura obliqua, lunato-ovaia, intus coerulescens, castaneo limbata; peristoma obtusulum, castaneum, marginibus callo castaneo extus bene marginato junctis, externo et basali levissime reflexiusculis, columellari compresso, acie albida, dilatato, appresso, umbilicum omnino claudente.

Diam. maj. 39, alt 35 mm.

Hab. Pelagonisi insulam Graeciae.

Zwei neue Arten aus Deutsch-Neuguinea

Von

W. Kobelt.

Planispira simbangensis n.

Testa umbilicata, depressa, fere discoidea, solida, polita, nitida, subtiliter striata, striis aperturam versus fortioribus, interdum costiformibus, albida nigro-castaneo bifasciata, fascia infera latiore, epidermide tenui fugaci lutescente (?levissime pilosa) induta, spira plana, anfractu penultimo tantum leviter prominente, apice excavato; umbilicus perspectivus, ad $\frac{1}{3}$ obtectus. Anfractus $4\frac{1}{2}$ convexi, sutura profunda discreti, superi lente, inferi celerius accrescentes, ultimus dilatatus, sat inflatus, rotundatus, longe descendens, antice gibboso-cristatus, dein constrictus, ad aperturam iterum dilatatus, et in umbilico distincte scrobiculatus. Apertura perobliqua, piriformi-circularis, modice lunata, alba fasciis translucens; peristoma expansum et undi-